

Novascabin emulzió 70 g **KÜLSŐLEG**

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen a dobozon feltüntetett betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- *Tartsa meg a dobozt, mert a rajta szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak..*

Mit kell tudnia a Novascabin emulzióról?

A Novascabin emulzió hatóanyagai a parazita ellenes szerek közé tartoznak, amelyek alkalmassá teszik a gyógyszerkészítményt a rühátka fertőzés külsőleges kezelésére.

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a Novascabin emulzió?

Hatóanyag: Dimentil-ftalát 0,75 g
Benzil-bezoát 21,25 g üvegenként (70 g emulzióban).

Segédanyagok: Poliszorbát 20, tisztított víz.

Mikor nem szabad alkalmaznia az Novascabin emulziót?

Nem szabad alkalmaznia a Novascabin emulziót, ha Ön

- előzetesen a dimentil-ftalát és/vagy a benzil-bezoát hatóanyaggal illetve a segédanyaggal szemben tapasztalt már allergiás reakciót;
- olyan gyógyszereket szed, amiről kezelőorvosa nem tud; ilyen esetben feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát. Egyidejűleg egyéb gyógyszereket csak a kezelőorvos engedélyével szabad alkalmazni.

Használható-e terhesség és szoptatás alatt?

Nincs bizonyíték arra nézve, hogy a Novascabin emulzió terhesség alatti használata biztonságos lenne, de a készítmény használatával szerzett több éves tapasztalat szerint az emulzió nem okozott semmilyen betegséget.

Mindamellet a készítmény alkalmazása terhesség alatt nem ajánlott, kivéve ha a kezelőorvos az előny/kockázat mérlegelése mellett úgy nem dönt.

A szoptatást fel kell függeszteni az emulzió használata során, de folytatódhat az emulzió lemosása után.

Befolyásolja-e a gépjárművezetéshez és a gépi munkavégzéshez szükséges képességeket?

A Novascabin emulzió gépjárművezetéshez és gépi munkavégzéshez szükséges képességeket befolyásoló hatása nem ismert.

Mire kell figyelemmel lennie a gyógyszer alkalmazása során?

Különös gondot kell azokra a helyekre fordítani, ahol a rüh tünetei láthatók, továbbá ahol a rüh leggyakrabban található, ujjak között, testhajlatok, csuklók, hónaljredők, emlők.

Gyermekek, csecsemők rühmegbetegedésénél is alkalmazható.

A nyálkahártyákat nem szabad bekenni. A családtagok fertőződhetnek, vizsgálatuk javasolt.

Az emulzió irritálja a szemet is, ezért védeni kell azt, ha a fejbőrön alkalmazzák az emulziót.

Hogyan kell alkalmaznia a Novascabin emulziót?

Ha az orvos másképpen nem rendelkezik, szappanos, meleg vizes fürdő után a gyógyszer fele mennyiségével az egész testet - a fej és a nyak kivételével - gondosan be kell dörzsölni. 30 perc múlva a gyógyszer másik felével a bedörzsölést - fürdés nélkül - meg kell ismételni. 12-14 óra múlva újra meleg

vizes, szappanos fürdőt kell venni és fehérenmút ill. ágyneműt váltani. A felső ruházatot forró vasalóval át kell vasalni.

Milyen mellékhatások alakulhatnak ki?

Ritkán bőrszárazság, enyhe irritatív bőrgyulladás. Ha a kezelés során allergiás reakciók lépnének fel, le kell mosni az emulziót szappannal és meleg vízzel. A gyógyszer alkalmazását abba kell hagyni és fel kell keresni az orvost.

Mi a teendő véletlen túladagolás esetén?

Irodalmi adatok megemlítik, hogy felnőtteknél vizelet-visszatartás és gyermekek esetében görcsök előfordulhatnak az eltúlzott helyi használat során. A bekent testfelületről lemosással az emulzió feleslege eltávolítható. Túladagolás esetén értesítse kezelőorvosát. Ha a Novascabin emulzió szájba kerül, vagy szájon át történő bevétele történt, keresse fel azonnal a legközelebbi kórház ambulanciáját vagy haladéktalanul hívja ki kezelőorvosát.

Hogyan kell tárolni a Novascabin emulziót?

Eltartása: Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

Használat előtt felrázandó.

OGYI-T-9796/01

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN)

Gy.sz.: Gy.i.: Felhasználható:

Forg.eng. jogosultja: Pannonpharma Kft. Pécs

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 31192/41/03