

Phlogosam hab

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- *Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.*

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a készítmény?

Hatóanyag:

dexpantenol 0,73 g,

lidokain 1,82 g,

vízmentes nátrium-szamárium-diszulfoszalicilát 2,18 g tartályonként.

Segédanyagok: Nátrium-edetát, cetil-sztearil-alkohol, benzil-alkohol, poliszorbát 20, n-bután, glicerin, 96 %-os etanol, tisztított víz.

Mit kell tudnia a Phlogosam habról?

Külsőleg alkalmazandó gyulladáscsökkentő, bőrregeneráló készítmény.

Milyen betegségek kezelésére alkalmas a Phlogosam hab?

I. fokú, és felületes II. fokú égési sérülések, nyílt sebek, napfény okozta bőrgyulladás, egyéb bőrgyulladások, mérgezés okozta bőrbántalom, lábszárfekélyhez társuló ekcéma, kontakt ekcéma kezelése.

Felszíni visszérgyulladás kiegészítő kezelésére.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?

A készítmény bármely összetevője iránti túlérzékenység esetén.

A törzs és végtagok körkörös sérülései esetén.

Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése előtt?

Ügyelni kell arra, hogy a készítmény ne kerüljön a szembe.

Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. Alkalmazása közben dohányzás és nyílt láng használata tilos!

A tartályt felnyitni, ütögetni, kiszűrni, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban sem szabad! Utántöltése tilos!

Alkalmazható a készítmény más gyógyszerekkel?

Mivel külsőleg alkalmazandó készítményről van szó, ezért nem valószínű, hogy a hatóanyagok, ill. egyéb összetevők jelentős mértékben felszívódnának a keringésbe és befolyásolnák egymás hatását.

Használható-e terhesség és szoptatás alatt?

A hab használata esetén a vérkeringésbe jutó hatóanyag mennyisége jelentéktelen, azonban nincsenek adatok az ebben az időszakban történő használatáról.

Terhesség, szoptatás ideje alatt történő alkalmazásáról kérje orvosa tanácsát.

Befolyásolja-e a gépjárművezetéshez és a gépkezeléshez szükséges képességeket?

Az említett képességeket várhatóan nem befolyásolja.

Hogyan kell alkalmazni a készítményt?

I. fokú égési sérülés esetén a seb egyszeri befújása elegendő, felületes II. fokú égési sérülés esetén a seb 3 óránkénti befújása szükséges 6-7 napon keresztül.

Egyéb esetekben naponta 2-4 szer alkalmazható.

A tartály használat előtt felrázandó!

A tartályt szeleppel felfelé fordítva és függőlegesen tartva, a habot 3-4 cm távolságból kell a kezelendő felületre juttatni.

Mi a teendő véletlen túladagolás (nem rendeltetésszerű használat) esetén?

A tartály teljes tartalmának véletlen, szájon át történt szervezetbe jutása esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

Mellékhatások nem jellemzők. Ritkán allergiás reakciók (kiütés, viszketés, bőrgyulladás) előfordulhatnak.

Amennyiben alkalmazás során szokatlan tüneteket, elváltozásokat észlel, elsősorban a kezelendő bőrterületen, a kezelést azonnal függessze fel, és keresse fel orvosát.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25°C-on, sugárzó hőtől védve tárolandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl nem szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Pannonpharma Kft., Pécs

OGYI-T-3566/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 31183/55/03