

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Septosyl szemkenőcs

szulfadimidin

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- *E recept nélküli kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*
- *Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.*

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Septosyl szemkenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Septosyl szemkenőcs alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Septosyl szemkenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. A készítmény tárolása

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A SEPTOSYL SZEMKENŐCS ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Septosyl szemkenőcs hatóanyaga az antibiotikumok csoportjába tartozó szulfadimidin, mely hatékony a baktérium okozta heveny és idült kötőhártyagyulladás, kötőhártya beszűrődés, fertőzött szemhéjgécéma kezelése során.

A készítmény hatóanyaga: 100 mg szulfadimidin 1g vazelin típusú kenőcsben.
Segédanyagok: koleszterin, fehér viasz, gyapjúviasz fehér vazelin, tisztított víz, folyékony paraffin.

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Pannonpharma Kft.
Pécs

Gyártó:
Wagner Pharmafax Kft.
Kunfehértó

2. TUDNIVALÓK A SEPTOSYL SZEMKENŐCS ALKALMAZÁSA ELŐTT

Mikor nem szabad alkalmaznia a Septosyl szemkenőcsöt?

Nem szabad alkalmaznia a Septosyl kenőcsöt, ha Ön

- előzetesen a szulfadimidin hatóanyaggal vagy más szulfonamiddal szemben tapasztalt már allergiás reakciót.

Felhívjuk a figyelmét az alábbiakra (és kérjük, ha erről kezelőorvosát esetleg nem tájékoztatta volna, azt haladéktalanul tegye meg!).

Terhesség és szoptatás

A szemkenőcs használata esetén a vérkeringésbe jutó hatóanyag mennyisége jelentéktelen.

Egyéb gyógyszerek alkalmazása

Óvatosan adható para-aminobenzoésav észterekkel (hatásuk csökkenhet).

A szemkenőcs használata esetén a vérkeringésbe jutó hatóanyag mennyisége jelentéktelen.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

A közlekedésben való biztonságos részvételt és a baleseti veszéllyel járó mukavégzést a hatóanyag önmagában nem befolyásolja, de a szemkenőcs használata után a beteg látása átmenetileg homályossá válhat.

3. Hogyan kell alkalmaznia a Septosyl szemkenőcsöt?

Általában naponta 2-3-szor borsónyi kenőcsöt kell az alsó szemhéj mögé helyezni, és a szemet becsukva, enyhe dörzsöléssel szétkenni. Ha a szemhéjra szükséges alkalmazni, a kenőcsöt a szemhéj szélére kell helyezni és ott vékonyan szétkenni.

Ha az előírtnál több Septosyl szemkenőcsöt alkalmazott:

Az előírtnál több Septosyl szemkenőcs alkalmazása sem okoz károsodást a szemben. A tubusban lévő mennyiség esetleges gyomorba jutása esetén sem merül fel a túladagolás veszélye.

Ha elfelejtette alkalmazni a Septosyl szemkenőcsöt:

Pótolja azt mielőbb, de a soron következő adagolásakor ne alkalmazzon dupla adagot.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Septosyl szemkenőcsnek is lehetnek mellékhatásai.

Alkalmazás után rövid ideig enyhe égő érzés és homályos látás léphet fel, ami nem csökkenti a kezelés hatásosságát. Ritkán allergiás reakciók előfordulhatnak szemhéjszél-ekcéma formájában.

A kezelés során esetlegesen kifejlődő bőrgyulladás esetén a Septosyl alkalmazását fel kell függeszteni.

Ha a kezelés során allergiás reakciók lépnének fel, a gyógyszer alkalmazását abba kell hagyni és fel kell keresni az orvost.

5. A készítmény tárolása

Eltartása: hűvös helyen (8°C- 15°C között), fénytől védve tartandó.

Felbontás után csak 1 hónapig használható!

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-3117/01

Betegájékoztató OGYI-eng.száma: 31.187/55/2003

A betegájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. december 27.